


Losun koltvíoxíðs (CO₂) og brennisteinsvetnis (H₂S) frá Hellisheiði 2002-2018 og Nesjavöllum 1995-2018

Skekkjumörk eru 5%.

Hellisheiði




Ár	CO ₂ tonn/ár	H ₂ S tonn/ár	H ₂ tonn/ár	CH ₄ tonn/ár
2003	3.600	1.300	80	*
2004	1.900	700	40	*
2005	4.600	800	*	*
2006	0	0	*	*
2007	24.200	6.900	280	20
2008	32.900	10.300	410	30
2009	35.300	8.600	270	35
2010	42.300	13.600	390	45
2011	39.500	12.200	400	55
2012	43.200	12.000	420	50
2013	44.900	12.400	530	70
2014	38.900	8.500	460	80
2015	33.100	6.400	390	80
2016	26.100	3.900	340	50
2017	23.600	2.900	340	50
2018	25.200	2.500	300	50

* Ekki eru til frumgögn fyrir árin 2005 og 2006

Skýringar við tölur 2018:

- 1) Dregið er frá það magn CO₂ og H₂S sem fer út með þéttivatni. Það var fyrst gert árið 2015.
- 2) Um 12.200 tonnum af CO₂ og um 7.000 tonnum af H₂S var dælt niður í jörðina í SulFix verkefninu.

Nesjavellir



Ár	CO ₂ tonn/ár	H ₂ S tonn/ár	H ₂ tonn/ár	CH ₄ tonn/ár
2003	11.100	5.900	310	15
2004	11.600	5.100	320	20
2005	13.300	8.900	410	30
2006	12.700	8.700	*	*
2007	15.400	10.300	410	25
2008	20.900	12.100	660	25
2009	19.900	12.200	640	25
2010	28.400	9.400	480	110
2011	14.800	9.400	470	50
2012	18.600	8.600	460	30
2013	14.800	8.700	480	45
2014	16.600	9.300	490	55
2015	14.700	8.400	500	55
2016	14.700	8.000	470	45
2017	14.000	6.800	370	30
2018	14.000	7.000	370	30

* Ekki eru til frumgögn fyrir árið 2006